

50 IU/1ml injection

IPACALCIN® Calcitonin - Salmon

موارد مصرف :

○ درمان بیماری پاژه استخوان

○ درمان کمکی هایپرکلسی می حاد

○ پیشگیری و درمان کمکی استئوپورز بعد از یائسگی



کلسي تونين سالمون ۵۰ واحد در ميلی لیتر

دسته دارویی:

جلوگیری کننده از پرداشت استخوانی، ضد یوکی استخوان

فارماکولوژی:

اپیاکسین® اکثراً بر روی استخوان تاثیر می گذارد، اما آثار مستقیم کلیوی و تاثیراتی بر روی دستگاه گوارشی هم دارد. البته تاثیرات کلسی تونین بر روی استخوان و فیزیولوژی استخوان به طور کامل شناخته شده نمی باشد.

فارماکوکینتیک:

زمان رسیدن به حداقل غلظت پلاسمایی بعد از تزریق آپاکلسانین[®] ۲۵-۱۶ دقیقه می باشد . به نظر می رسد این دارو از جفت عبور نمی کند. ضمناً عبور آن از مایع مغزی نخاعی بسیار ناجیز است . اتصال به پروتئین پلاسمای آن ۴۰-۳۰٪ و فراهمی زیستی آن حدود ۷۰٪ می باشد. نیمه عمر حذف آپاکلسانین[®] در حدود ۹۰-۷۰ دقیقه می باشد

موارد مصرف:

۱. درمان بیماری پاژه
 ۲. درمان کمکی و اولیه هایپر کلسمی
 ۳. درمان پوکی استخوان بعد از یاپنسکی
 ۴. کنترل درد استخوان در نتپلاسما ها

روش و مقدار مصرف:

میرگسان:

- در بیماری پاره دوز اولیه 100 mg در روز زیر جلدی یا عضلانی.
 - در هایپرکلسمی دوز اولیه 40 mg هر 12 ساعت زیر جلدی یا عضلانی، اگر پاسخ مناسب داده نشود، دوزهای 80 mg هر 12 ساعت افزایش داده می شود.
 - این روند تا حداقل 80 mg هر 6 ساعت قابل افزایش می باشد.
 - درمان استئوپروز پس از یائسگی 100 mg زیر جلدی یا عضلانی یک روز در میان پیشنهاد شده است.
 - کنترل درد استخوانی ناشی از بدخیمی 200 mg هر 6 ساعت یا 400 mg هر 12 ساعت زیر جلدی یا عضلانی حداقل تا 48 ساعت می باشد.

کودکان:

مقدار و نحوه مصرف مشخص نشده است.

مصرف در بارداری و شیردهی:

تزریق ایپاکلزین[®] در دوره بارداری فقط در صورتی که فوائد آن بیش از خطرات آن باشد، باید انجام گیرد. ترشح دارو در شیر ناشناخته است و مادرانی که به نوزادان خود شیر می دهند، باید از آن استفاده نمایند. مصرف در بارداری رده C می باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

- در صورت وجود حساسیت مفرط به کلسی تونین سالمون از مصرف دارو خودداری گردد.
 - به علت احتمال بروز فلچ هایپوکلسمیک، در هنگام اولین تزریق، کلسیم تزریقی در دسترس باشد.
 - از مصرف داروی تغییر رنگ داده و یا حاوی ذرات پاید خودداری گردد.

عوارض جانبی:

اسهال ، تهوع و استفراغ در ۱۰٪ بیماران به ویژه در اولین تزریق دیده شده است . التهاب موضعی در محل تزریق ، بر افروختگی صورت یا دست ، راش پوستی ، شب ادراری ، خارش لاله گوش ، درد چشم ، درد شکم ، درد پاهای و طعم شور در دهان نیز گزارش گردیده است.

تداخلات دارویی:

مورد خاصی از تداخل داده‌ی کزارش نشده است.

نحوه نگهداری دارو:

دور از نور، درون بخجال (۲-۸ درجه سانتی کراد) نگهداری و از بین زدگ، محافظت گردد.

مسنون

هر پسته حاوی ۵ عدد آمپول اپیاکلسين® ۵۰ واحد در میلی لیتر می باشد.



5 Ampoules of 1 ml

IPACALCIN®

Calcitonin (salmon) 50 IU/ml

- Each ampoule (1ml) contains:
Calcitonin (salmon) 50 IU

IM, SC Injection

- See the enclosed leaflet for more information.
- Store in refrigerator (between 2-8°C).
- Protect from light and freezing.
- If the volume to be injected exceeds 2ml, the IM route of administration is usually preferred and multiple sites of injection should be used to minimize local inflammatory reactions.

www.caspian-tamin.com
Manufactured by: Caspian Tamin Co.
Paveh-Esfahan-Razavi Industrial Zone-Rashid-Iran

 **Caspian**
Tamin
Pharmaceutical Co.
Rashid-Iran